| Composition | Azadirachtine 3,19% p/p (31,95 g/l) | Formulation | Concentré Émulsionnable (EC) |
|---|---|---|---|
| N° AV | E10-2-005 | | |
| Conteneurs | 1 litre | | |

# Oikos

## Insecticide biologique et systémique

L'insecticide naturel

### CARACTÉRISTIQUES

Il s'agit d'un insecticide naturel d'origine végétale, systémique, qui agit par contact et ingestion avec plusieurs modes d'action. Il inhibe la formation de l'ecdysone, l'hormone responsable des processus de mue des insectes, qui ne peut donc pas être achevée, ce qui leur provoque la mort. Il possède aussi un effet anti-alimentaire, de répulsion, de confusion sexuelle et d'inhibition de la ponte chez les femelles nuisibles. Son spectre d'action est spécifique pour les insectes et autres arthropodes en états larvaires.
OIKOS est compatible avec l'environnement et n'est pas toxique pour les plantes, les personnes, les mammifères, les oiseaux ou la faune auxiliaire (insectes prédateurs, parasites, pollinisateurs, etc.).

Usages Agricoles, Délai Avant Récolte (jours), Ravageurs et Doses d'Emploi

| Cultures | DAR (jours) | Ravageurs | Doses |
|---|---|---|---|
| AGRUMES | 3 | Mineuse | 70 cc/hl |
| | | Cératite | 80 cc/hl |
| HARICOT VERT | 3 | Mouche blanche | 30 cc/hl |
| POIVRON | 3 | Thrips | 70 cc/hl |
| TOMATE | 3 | Mouche blanche | 70 cc/hl |
| | | Noctuelles | 70 cc/hl |

### PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Le manipulateur du produit doit être muni de tous les moyens de protection (gants, tenues, visières, masques...). Produit nocif par inhalation et irritant. Peut provoquer une sensibilisation par contact avec la peau, en cas de contact avec la peau, laver toutes les parties contaminées à l'eau et au savon, en cas de projection dans les yeux, rincer pendant 15 mn. En cas d'intoxication par ingestion, boire un ou deux verres d'eau et provoquer le vomissement. Si le patient est inconscient, ne pas faire boire de liquide ni provoquer le vomissement. Faure appel au médecin. Ne pas manger, boire ou fumer pendant le traitement.
Interdire l'accès aux parcelles traitées aux enfants et aux personnes non impliquées dans les opérations de traitement.
Stocker dans des endroits bien aérés loin des boissons et denrées alimentaires et hors de la portée des enfants et personnes non averties.
Les restes de bouillies et les eaux de rinçage ne doivent en aucun cas contaminer les cours et points d'eau. Produit dangereux pour les organismes aquatiques.

### MODE D'EMPLOI

Pour obtenir les meilleurs résultats il faut que la bouillie de pulvérisation ait un pH acide (4-6) ainsi qu'un mouillant approprié. Traiter de manière préventive ou lors des premiers stades larvaires (car il n'y a pas d'action sur les adultes ni sur les œufs) et répéter les traitements chaque 7-10 jours, selon l'évolution de l'insecte et la plante. Traiter préférablement aux dernières heures de l'après-midi. Conserver le produit à l'abri de la lumière solaire et préférablement à des températures inférieures à 20-25°C.

compatible avec la faune auxiliaire

PRODUIT CERTIFIÉ EN U.E POUR SON USAGE EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

SIPCAM INAGRA